

瞭解您的藥物中都有些什麼

TRANQ | 甲苯噻嗪

甲苯噻嗪 (Xylazine) 是一種動物用鎮靜劑，摻入麻醉劑中，可延長吩坦尼 (fentanyl) 的藥效。它在波多黎各被稱為“anestesia de caballo”，在芝加哥被稱為“tranq”。




2019年1月至2022年6月，在伊利諾州190多例藥物過量死亡病例的體內發現了Tranq，該死亡人數每6個月就會出現大量的遞增。



將tranq與其它藥物（如吩坦尼、海洛因或苯駢）混合使用時，就會增加過量服用的機率。如果某個人出現過量服用的情況，需要像平時一樣使用納洛酮 (naloxone) 來救治。如果患者重新開始呼吸，但仍處於鎮靜狀態，則無需服用更多的納洛酮。將其安置在一個安全的地方，並進行密切的關注。



Tranq會導致出現非常嚴重的傷口，並且會很快擴大和惡化。



無論人們採用怎樣的使用方法，都會出現這些傷口：吸入、鼻吸或注射。這些傷口很難自行癒合，因此，一旦出現傷口，請就醫治療。

如果您懷疑麻醉劑中含有tranq，您可以做些什麼？



隨身攜帶納洛酮



慢慢起步，慢慢前行



告訴其他人，您正在使用藥物

首先，在購買或使用藥物之前，嘗試多方詢問，看看別人的使用感受如何。由於使用tranq後會嚴重犯困，請盡量在一個安全的地方使用，以免摔倒受傷。最後，如果您懷疑麻醉劑中含有tranq，請告知他人——包括本地注射器更換項目的人員，這樣人們就知道需要注意了。

Help is here.

833-2FINDHELP
HelplineIL.org



請勿在孤身一人時使用

英語熱線：800-484-3731

西班牙語熱線：800-928-5330

Brave應用程式

請在app store下載